


# Alerta por primer caso de sarampión en Long Island



(FOTO: CDC)

El sarampión puede ser contagioso hasta 2 horas después de que la persona infectada se haya ido de un lugar que visitó.

Por: Redacción  
editorial@noticiali.com

El Departamento de Salud de Suffolk, en Nueva York, confirmó el primer caso de sarampión en ese condado, en una persona que llegó desde Europa a Long Island, y han comenzado a investigar el posible contagio de otras personas con la enfermedad.

Las autoridades sanitarias han entrevistado a unas 50 personas en Suffolk, en un intento de evitar la propagación de la enfermedad. El sarampión puede ser contagioso hasta dos horas después de que la persona infectada se haya ido de un lugar.

Este primer caso fue descubierto el pasado sábado en una persona, que no ha sido identificada porque la ley lo prohíbe, que llegó el pasado 2 de abril desde un país europeo, que no tiene las mismas reglas de inmunización que en Estados Unidos, de acuerdo con el director del Departamento de Salud de Suffolk, James Tomarken.

Entre los entrevistados figuran empleados del banco que visitó y las autoridades sanitarias les han pedido que informen a los clientes que estuvieron en esa entidad en el mismo horario que la persona contagiada que se comuniquen con el Departamento de Salud.

Tomarken considera que las posibilidades de contagio "son muy bajas",

pero no escatiman en los esfuerzos para que no se propague. Igualmente han pedido a los que estuvieron en la misma farmacia y supermercado que se comuniquen con Salud.

Cualquiera que haya visitado los siguientes lugares en Suffolk puede haber estado expuesto al sarampión:

- King Kullen, 52 East Montauk Highway, Hampton Bays, NY, el 20 de abril entre las 2:30 p.m. y 5 p.m.

- CVS, 111 South Main Street, Southampton, NY, el 20 de abril entre las 4:45 p.m. y 7 p.m.

- BNB Bank, 48 East Montauk Highway, Hampton Bays, NY, el sábado 20 de abril de 12:15 p.m. hasta que el banco cerró a la 1:00 p.m.

Todas las personas que estuvieron expuestas al sarampión deben comunicarse con su proveedor de atención médica para evaluar su inmunidad contra el sarampión.

Aquellos que tengan síntomas consistentes con estos se les recomienda ponerse en contacto con su proveedor de atención médica, una clínica local o un departamento de emergencias local antes de acudir a la atención. Esto ayudará a evitar que otras personas en estas instalaciones estén expuestas a la enfermedad.

Cualquier persona que tenga preguntas puede llamar a la Oficina de Control de Enfermedades Transmisibles del Departamento de Servicios de Salud del

Condado de Suffolk al 631-854-0333, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Después del horario de atención y los fines de semana, llame al 631-631-852-4820.

## Que no cunda el pánico

La ciudad de Nueva York afronta un brote de sarampión que comenzó el pasado octubre y ya acumula 390 casos, la mayoría de ellos en las comunidades judías ortodoxas en el distrito de Brooklyn, en niños y adultos que no se han inmunizado contra el sarampión o no completaron todas las vacunas requeridas.

Cabe indicar que el vecino condado neoyorquino de Rockland, a las afueras de la ciudad, también hay un brote y ya suman 200 casos.

"Este no es momento para el pánico, pero debe ser una llamada de atención", indicó por su parte el ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, quien pidió a los padres que revisen sus expedientes de vacunas y los de sus hijos.

Las autoridades sanitarias supieron del caso cuando la persona contagiada acudió a un hospital tras experimentar los síntomas de la enfermedad, que pueden incluir fiebre, ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis), goteo nasal, tos y erupción en la piel color rojiza.

Las autoridades han dicho que esta persona tuvo un periodo de contagio entre el 15-23 de abril pero ya fue tratada en el hospital. De acuerdo con

Tomarken, en Suffolk solo ha habido 4 casos de sarampión durante las pasadas dos décadas, contagiados durante viajes al extranjero.

El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk señala que en este momento, el caso encontrado no parece estar relacionado con ningún caso actual de sarampión ocurrido en el estado de Nueva York. Y en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York está investigando esta situación y tomará las medidas apropiadas en función de los hallazgos.

## Tratamiento preventivo

Las personas se consideran protegidas o inmunes al sarampión si nacieron antes de 1957, han recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), han tenido la enfermedad del sarampión o se han realizado pruebas de laboratorio que confirman la inmunidad. Las personas que no son inmunes al sarampión y que estuvieron expuestas están en riesgo de desarrollar sarampión.

Se recomienda el tratamiento preventivo para el sarampión para las personas sin evidencia de inmunidad de la siguiente manera: la vacuna MMR se puede administrar a personas expuestas elegibles dentro de las 72 horas de la exposición O se puede administrar inmunoglobulina dentro de los 6 días de la exposición.

El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus que se transmite por contacto directo con las secreciones nasales o de la garganta de las personas infectadas. Las personas primero desarrollan fiebre, luego pueden tener tos, secreción nasal y ojos llorosos, seguidos de la aparición de una erupción.

Las personas se consideran infecciosas desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de la erupción. Los síntomas generalmente aparecen 10-12 días después de la exposición, pero pueden aparecer tan pronto como 7 días y hasta 21 días después de la exposición. La mejor manera de prevenir el sarampión es vacunarse. Para obtener información sobre el sarampión, visite <http://www.health.ny.gov/publications/2170> o <https://www.cdc.gov/measles/index.html>.